

遠至近
一而

外。出。而後補。此法似以精力
勝。未易驟廢。外。出也。
。。

陰毛之有無問題 (彭祖壽)

余不敏。對於生理醫道。素
鮮研究。故於身體結構組織
上。常發生疑難。即以陰毛
有無一問題論之。疑團之未
釋者久矣。就普通言。男女
漸到發育年齡後。陰毛即逐
漸生長。髮莖甚壯。然。佈滿
陰部。然有少數男女。以生
理特殊故。一毛不殖。童山
濯濯。俗謂之白板。據一般
人云。男稱青龍。女稱白虎
。如雙雙交配。則青。反之
則凶。此則陰毛之有無。又波
及至命運矣。世有精深之生
理研究。及醫道明者。請
釋余之疑團。并鑒對此問題
。作切實可靠之答復。茲幸
福矣。

一個患重舌症之病人

困外、尋覓食物、又尋常鰓類、每結絲幕居席、則獨行覬覦、鮮有見其二頭同行者、彼等以野草、苦荬、花子、樹葉及一種酸樹之枝幹爲其主要食物、凡麋鹿之專以此項酸樹之枝幹爲食者、據醫分藏之麋鹿較寬、而品質亦較優、藏人不食麋、更謂麋鹿之食較不食麋者易於捕獲、因中蛇之毒以致無病、不齊走避也、麋鹿雌雄均無角、撲摸加察則視之、不易分辨、追類加確察則見雄者有巨齒向前顯出、後端路有彎曲、雌者齒向前直、後端路麋鹿之足、殊堅堅尚有力、後足

○一個患重舌症之病人

(章成之(中和)作)

今春閏月初六日臨診所十里之程、有一男子來詢余重舌症能醫否、余讀數年前在首都某師範、曾見此症、可彼日院如此、猶憶生至舍下一念、余遂檢點診具、步至該宅、詢悉病者爲姓莊、年三十七、云前月一診八日發生此症、會就治薛卓欽某醫士、內則服藥數劑、外則以湯水藥貼於患之外部、思慮以冰敷散涼之、故不見功效、反而湯水難下、言余診其脈象、兩寸洪散無洪、弦、但、視其舌、舌尖上頂於上腭、舌下重舌長約寸許、類蛇齧肝狀、而吾之周圍均有此現象、余思外科諸書、雖有治法、莫過內投瀉心湯、外敷冰散劑、余因先父有專製喉科化毒丸、於喉科大見功效、余乃以此丸投之數粒、復投以增液湯心加生毒一劑、外以烙法烙之、次痛痛頓失、再以原方重川連山梔二劑、霍然全愈、已精神煥發、談吐文雅矣、(下期讀陳文先生藏)

今之藥商。每以僞藥欺人。上海一隅。幾乎
週目皆是。以致病家無從選擇。而其中之
獨冒一省。尤爲尤甚。讀其廣告。漫應無不購
而試之。效等於零。每使病家虛有錢無處
買藥之痛者。本大經實地試驗。確見功效。
故敢問世。自發行以來。銷路一空。致後來
者徒勞往返。到藥實深。今應病家之要求。
第二批已於前日。仍托上浙江路路北
京路第二批。洪德里。老福報館代售。惟所製無

（姚夢石）

在何經、常用何藥、察形辨色、在乎心得、非一定也、其外癢手續、總不外去腐拔毒、生肌而已、
 疔瘡不吊此方極靈
 犀角五分 硃砂五分 耳衣五分 紅升二兩 寒水石一兩
 杜鵑六分 麝香八分 硃砂一兩 沒藥三兩 淨明礬五分
 白丁香五分 即當厘火頭雄者可、用、凝脂十條在烈日中化開煑熟
 石各研細末、和水泛為丸、或條用磁瓶收貯、飛令走氣、如遇行毒
 者、不論大小、用刀撥開、將此丸以粒大、插入、便能化毒消腫、萬
 無一失、立見用行丹丹方載外科金鑑用法同前、予藥向杭州胡
 慶隆購之、每粒價一分
 (一)藥具在昇樂鋪購辦(如浙之新市、周光通、神市、蔣生堂均有)
 念陳愈佳
 (二)玉梧丹即紫金錠(藥鋪均備)塗一切無名腫毒如蟪蛄酥少許

〔朱潛〕

太乙回生丹

溫陳六錢 射香五釐 輕粉三錢
西月石三錢 腰黃六錢 寒水
石三錢 冰片五釐 製乳香五分
右藥各研極細末，候天氣晴爽之
日，加以冰麝，搗也。施以局部之
手術，卒之，熱減而病增，瘡癰
而毒蔓生內，危及一身。
偏方流傳於窮鄉荒村，婦孺口相
告誡，各歸出人意外，而每獲神
效焉。

信乎，不敢知也，
憂婦產兒，衛兒之重，食羊肉如
之，曰跌肉補肉，足見其體質強

十五至二
狀、此乃

余非醫也、亦不解醫道、姑以區區之意、言人所共知之經籍、余也姑妄言之、讀者亦姑妄聽之也可、

無良醫、毋寧不醫、不醫或可自意、而誤於庸醫石、正不少耳、傷風咳嗽、不可漫不驚意、亦不可大驚小怪、漫不經意、固定以釀成大疾者、我亦見有大驚小怪而釀成大疾者矣、

貧兒少疾病、富兒多疾病、貧兒徒視之而多生、富兒珍護之而多死、我人當略識藥性醫理、不致百無見地、見思於庸醫、

所謂名醫者、名耳、其真學識之有無、不敢必、而非名醫者、我正恐其多良醫也、

因醫徒知改過、不探病原、熱也如下、

一、太冷或太熱、二、饑餓或口渴、三、莖布尿濕、四、衣服太緊、五、有所痛癢、六、疾病、七、習慣性、小兒啼哭既有如上所述之多種、故其啼哭之聲音與狀態、亦隨之而不同、須詳細審視、按其原因而治之、

一、若因太熱、察其是否出汗、莖襦子易出汗、汗後受冷、易致感冒、故須緩緩使涼、勿可驟令受冷、

若防因寒、察其手足冷熱如何、以加溫暖、嬰兒之足、嚴寒時、宜用熱水袋袋之、多季宜穿絨絨襪、則換尿布時、亦不受冷、

二、饑餓以物觸唇、饑哭不斷而無力、凡有厭煩之狀態、其口常作咀嚼狀、以物觸唇、即開口吮吮、此乃饑餓之表示也、須察看乳罐身體如何、乳汁如何、酌量加增其飲料、

三、尿布濕污、下部不舒、亦欲啼哭、更換潔淨、即安靜無事矣、

四、如臀部洗滌不勤、致紅腫或傷而痛、則亦常常啼哭、

因痛而哭之狀態、聲音尖利、哭時斷斷無定(因痛止後、哭亦停止、復痛則再哭、故其哭斷續不定)屈曲兩腿、雙手掙動不安、雙腿緊縮、淚液甚多、此乃有痛之表示也、須察看其內衣、有否蟻蚤毒虫等、

嘔吐、此當察其大便顏色及次數如何、腹、部與胃部有否滿脹、因小兒飽飽、自不知餓、易患腸病、引起腹痛甚多、